



INSECTICIDE HAUTE DÉFINITION
**CONNECTÉ À
VOS BESOINS**

Daskor™ 440

INSECTICIDE

CHLORPYRIPHOS
METHYL
EXCLUSIVITÉ
Dow AgroSciences

VIGNE | LÉGUMES | COLZA | CÉRÉALES | POMME DE TERRE



Dow AgroSciences

Solutions for the Growing World™

VIGNE



- > Une efficacité sécurisée grâce à un triple mode d'action : contact, ingestion et inhalation.
- > Une application larvicide à «tête noire» permet de contrôler les chenilles d'Eudémis et de Cochylis.
- > Les attaques de Pyrale seront gérées précocement (stade 5 mm des larves), dès l'observation du ravageur.

L'alliance des deux substances actives, complémentaires, offre aussi une excellente protection contre les cicadelles vertes et les cicadelles de la flavescence dorée.



AUBERGINE, TOMATE



Daskor™ 440, une solution pour les Solanacées de plein champ :

- > Le doryphore peut aussi s'attaquer à l'aubergine ou à la tomate. Appliquez **Daskor™ 440** sur les premiers foyers détectés. Ce sont les jeunes larves du coléoptère (stade grains de blé) qui devront être visées pour un résultat optimal.




- > **Daskor™ 440** permet de lutter contre les noctuelles défoliatrices des fruits de la tomate. Intervenir en suivant le Bulletin de Santé du Végétal régional réalisé après piégeages ou dès l'observation des premiers dégâts dans la parcelle.



APPLICATION: Daskor™ 440

(EC, 400 g/L chlorpyrifos-méthyl + 40 g/L cyperméthrine)

	Dose autorisée 	DAR (délai avant récolte)	ZNT (zone non traitée)
 USAGE SUR COLZA Mélégèthe, charançon des tiges	0,625 L/ha	application avant floraison	20 m
 USAGE SUR CÉRÉALES Puceron des épis Puceron du feuillage	0,625 L/ha 0,75 L/ha	28 jours jusqu'au stade BBCH 51	20 m 20 m ⁽¹⁾
 USAGE SUR POMME DE TERRE Doryphore, pucerons	0,75 L/ha	21 jours	20 m
 USAGE SUR VIGNE Cicadelle des grillures, cicadelle de la flavescence dorée Eudemis et Cochylis Pyrale	0,5 L/ha 0,5 L/ha 0,625 L/ha	21 jours 21 jours 21 jours	20 m 50 m ⁽²⁾ 50 m
 USAGE SUR TOMATE DE PLEIN CHAMP Doryphore Chenilles défoliatrices et des fruits	0,75 L/ha 1 L/ha	5 jours 5 jours	20 m 50 m
 USAGE SUR AUBERGINE DE PLEIN CHAMP Doryphore	0,75 L/ha	5 jours	20 m
 USAGE SUR PAVOT ŒILLETTE Pucerons	0,75 L/ha	application avant floraison	20 m

(1) Pour protéger les organismes aquatiques, ne pas appliquer sur des sols drainés en période de drainage. Pour protéger les arthropodes non ciblés, respectez une zone non traitées de 5 m par rapport à la zone non cultivée adjacente. (2) Bien que la dose apportée à l'hectare soit identique, les ZNT sur cicadelles et tordeuses sont différentes. Ce décalage provient d'une différence dans la période d'application : application précoce pour cicadelles et tardive pour tordeuses.

Daskor™ 440 : Concentré émulsionnable (EC), contenant 400 g/L de Chlorpyrifos-méthyl* + 40 g/L de Cyperméthrine**. AMM N° 2110078 - Dow AgroSciences SAS. Danger, H302, H304, H315, H317, H318, H336, H410. **Responsable de la mise en marché : Dow AgroSciences Distribution S.A.S. 371 rue Ludwig Van Beethoven 06560 Valbonne.** N° d'agrément PA00272 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels.  **0 800 470 810**

® ™ : Marque de The Dow Chemical Company ('Dow') ou d'une société affiliée. * Substance active brevetée et fabriquée par Dow AgroSciences. ** Substance active brevetée et fabriquée par SBM Development. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi : se référer à l'étiquette des produits et/ou sur www.phytodata.com.



Dow AgroSciences

Solutions for the Growing World™

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.