

Vantaggi competitivi

- **Potente azione** per contatto e ingestione su larve di carpocapsa, tortricidi ricamatori e fillominatori
- È il **larvicida di riferimento** nei programmi contro I e II generazione di carpocapsa
- **Attività importante** su uova e neanidi di psilla
- Possibilità di **gestire con successo** carpocapsa e psilla
- **Ideale** per i programmi di produzione integrata

5

Delegate™ WDG

SCHEDA TECNICA

Giugno 2017

Composizione:
spinetoram puro g. 25 (250 g/kg)
Coformulanti q.b. a 100 g

Formulazione:
Granuli idrodispersibili

Confezione:
Bottiglia HDPE da 0,1 kg
Bottiglia HDPE da 0,5 kg
Bottiglia HDPE da 1 kg

Registrazione:
n° 17014 del 14/06/2017
del Ministero della Salute

Imballo:
20 confezioni da 0,1 kg
10 confezioni da 0,5 kg
10 confezioni da 1 kg

Classificazione:



ATTENZIONE



Per ulteriori
informazioni
fotografa il QRcode

Usare i prodotti fitosanitari con precauzione. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Si richiama l'attenzione sulle frasi e simboli di pericolo riportati in etichetta.

 **Dow AgroSciences**

DOW AGROSCIENCES ITALIA s.r.l.
Direzione Commerciale: 40126 BOLOGNA
Viale Angelo Masini 36 - Tel. +39.051.286.61.11
www.dowagro.com/it
email: fbidas1@dow.com

Delegate™ WDG
è marchio della
The Dow Chemical Company
("DOW") o di filiali della Dow

 **Dow AgroSciences**

Delegate™ WDG

IL RISULTATO DELLA COMBINAZIONE
TRA NATURA E INGEGNO UMANO

Solutions for the Growing World

NOVITÀ 2017





Sostanza attiva:

- Delegate WDG contiene 250 g/kg di spinetoram in granuli idrodispersibili.
- **SPINETORAM** è un insetticida ad ampio spettro d'azione appartenente alla famiglia chimica delle **SPINOSINE**.
- IRAC lo ha inserito nel gruppo 5, lo stesso di spinosad. Avendo lo stesso meccanismo di azione, sono indispensabili alcuni accorgimenti per evitare l'insorgenza di resistenza.
- **SPINETORAM** possiede una **spiccata attività translaminare che ne consente una rapida traslocazione** all'interno dei tessuti vegetali, pur non essendo un vero e proprio insetticida sistemico.
- E' in grado di spostarsi dalla superficie fogliare trattata al **mesofillo** e questa penetrazione può essere aiutata con l'aggiunta di additivi. **SPINETORAM**, una volta raggiunto il mesofillo, rimane in quella sede e non trasloca nelle foglie non trattate.
- Delegate WDG esplica una potente attività larvicida sia per ingestione che per contatto immediatamente dopo l'applicazione.

Spettro d'azione:

- Delegate WDG è autorizzato per il controllo di carpocapsa (*Cydia pomonella*), tortricidi ricamatori (*Pandemis spp.*, *Argyrotaenia pulchellana*, *Archips spp.*, *Adoxophyes spp.*) e fillominatori (*Leucoptera scitella*, *Phyllonrictor spp.*)
- Delegate WDG controlla la psilla del Pero (*Psylla pyri*)
- Dose d'impiego: **300-400 g/ha**

Programma di difesa:



Vantaggi della linea:

- Fondamentale per la gestione della resistenza
- Compatibile con antocoridi ed altri insetti utili
- Appena la soluzione è asciutta non risulta tossico per le api
- Profilo residuale adeguato alle richieste della filiera
- Limiti massimi di residuo armonizzati in Europa

Colture registrate:*



MELO

PARASSITA: *Carpocapsa*, *Tortricidi ricamatori*, *Fillominatori* e *Psille del melo*

Dosi: 300-400 g/ha

| N° max di tratt. annui | Intervallo di sicurezza |
|------------------------|-------------------------|
| 1 | 7 gg |



PERO

PARASSITA: *Carpocapsa*, *Tortricidi ricamatori*, *Fillominatori* e *Psilla del pero*

Dosi: 300-400 g/ha

| N° max di tratt. annui | Intervallo di sicurezza |
|------------------------|-------------------------|
| 1 | 7 gg |



PESCO, NETTARINA

PARASSITA: *Cidia*, *Anarsia*, *Moscerino asiatico della frutta* e *Tripidi estivi*

Dosi: 300-400 g/ha

| N° max di tratt. annui | Intervallo di sicurezza |
|------------------------|-------------------------|
| 1 | 7 gg |



SUSINO, ALBICOCCO, CILIEGIO

PARASSITA: *Cidia del pesco*, *Cidia del susino*, *Anarsia*, *Moscerino asiatico della frutta* e *Tripidi estivi*

Dosi: 300-400 g/ha

| N° max di tratt. annui | Intervallo di sicurezza |
|------------------------|-------------------------|
| 1 | 7 gg |



OLIVO

PARASSITA: *Tignola dell'olivo*

Dosi: 75 g/ha

| N° max di tratt. annui | Intervallo di sicurezza |
|------------------------|-------------------------|
| 1 | 21 gg |

Altre colture registrate: Melo cotogno, Melo selvatico, Nespolo, Nespolo del Giappone, Nashi, Amarena e Mirabolano

* Dosi riferite alla coltura. Per i parassiti specifici fare riferimento all'etichetta.